

El papel del diagnóstico tardío en el desarrollo de EM / SFC severa

 emerge.org.au / diagnóstico / think-might-mecfs / 911-2 /

Aproximadamente el 25% de las personas con EM / SFC pueden clasificarse como gravemente afectadas, es decir, están en silla de ruedas, en casa o en cama y presentan una multitud de síntomas complejos que afectan dramáticamente la calidad de vida, hasta tal punto que el nivel de deterioro en la EM / SFC severa es más extremo que en la enfermedad renal en etapa terminal y la enfermedad cardíaca.

De particular interés para la ME Alliance es el papel del retraso en el diagnóstico en el desarrollo de ME grave.

El epidemiólogo de investigación, Dr. Derek Pheby, ha realizado un estudio de los factores de riesgo que podrían estar involucrados en el desarrollo de EM / SFC severa. Los datos obtenidos de los cuestionarios recibidos de 124 personas gravemente afectadas con EM / SFC se compararon con un grupo de control de 619 afectados leve o moderadamente.

Un hallazgo clave del análisis de los resultados es que la gravedad está relacionada con la cantidad de tiempo que transcurrió antes de que se hiciera el diagnóstico: aquellos que estuvieron enfermos durante más de un año antes de recibir un diagnóstico de un médico tenían más probabilidades de estar gravemente enfermos que aquellos que Esperó menos de un año. Solo el 27% de los casos graves se diagnosticaron en un año, en comparación con el 54% de los que fueron leves o moderadamente afectados.

Referencias

ME Alliance, Diagnóstico de EM / SFC: “ Retraso en la salud. Diagnóstico temprano: ¿por qué es tan importante? Un informe de la Alianza ME ”, Dr. Charles Shepherd.

Derek Pheby y Lisa Saffron, “ Factores de riesgo para EM / SFC severa ”, Biología y Medicina, 2009, **1** (4): 50-74.
